


1778








PERENNI MEMORIÆ
NOBILIS VIRI
FRANCISCI QUESNAY, EQUITIS,
ACAD. REG. CHIR. PARIS. SECRET. PERPETUI,
SCHOLARUM REGII PROFESSORIS,
REGIS MEDICI PRIMARI PERPETUO ORDINARI,
REGIQUE A CONSILIIS MEDICIS,
ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM PARISIENSIS,
REGIÆ SOCIETATIS LONDIN. ET LUGDUN. SOCI, &c.
AVI SUI IN PERPETUUM VENERANDI,

*Has Laboris sui primitias vovet, offert & consecrat
LUDOVICUS-PRUDENTIUS - ALEXANDER HEVIN,
Collegii Chirurgiæ Parisiensis Candidatus.*



THE NEW YORK
LIBRARY
FRANCIS & TAYLOR
NEW YORK
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



T H E S E S
ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.

AN IN FRACTURIS ARTUUM
GRAVITER COMPLICATIS
AMPUTATIO ILLICO CELEBRANDA,
VEL PROCRASTINANDA?

HOMINEM impugnat undequaque dira malorum cohors,
dùmque pro conditione suâ innumeris obnoxius versatur morbis,
frequentia sæpius imminent pericula, quibus nova procreatur
malorum series. Equidem sic à Naturâ constitutus est homo, ut
sanus diù vivere vix queat: solida, modò rigida, modò laxa, flui-
dorum motum & indolem pervertunt; fluida vitiata solidorum
actionem immutant, sicque sibi mutuo nocent concursu. At
dùm ità ad ruinam tendit corporea moles, crudeliùs periculosius-

A ij

que afficitur variis causis externis quæ corpus velociter impetunt, solida dilacerant, ossa conterunt, machinæ cladem intendant, sæpiùsque ipsius destructionem inter dolores & accidentia subito operantur.

Multiplicem & horrendam malorum externorum imaginem exponere supervacaneum ducimus; impetus violentos corporum externorum suprà corpus humanum, sive corporis humani suprà corpora externa, attendere satis sit. Huic violentiæ inter armorum tumultus sclopetorumque fragores frequentius objicitur generosus miles; hanc in adimplendis variis vitæ muniis, inter dulcia pacis otia, rariùs experitur laboriosus civis: his omnibus operam efficacem præstat Chirurgia, partes redintegrans, vel etiam pro necessitate separans, in utroque casu, non minùs salutaris. In fracturis ergò artuum complicatis non eadem est medela; dùmque partes redintegrari & conservari nequeunt, tunc unicum, licet crudele, auxilium, amputatio tentanda. An verò sæpiùs omittenda? an, dùm necessaria judicatur, citiùs celebranda vel procrastinanda? difficilius judicium, habitâ tamen ratione mali, percutientis violentiæ, commotionis, &c. solvendum. Ad eundem finem non minùs etiam attendenda partium structura quam cognitam supponimus, & de quâ, quantum ad rem pertinet, differemus.

Solutio quælibet continui facta in ossibus, à causâ externâ, violentâ, contundente, suprà corpus agente, vel à corpore in eam violentiùs impingente, fractura audit; hinc distinguitur fractura à vulnere ossis & à carie.

Causæ ergò fracturarum omnes externæ, & ad actiones quascumque violentas, quæ ossium resistantiam superant, debent referri; hinc fracturæ simplices. Si verò vehementior sit actio, licet major sit ossium resistantia, ossa non tantùm franguntur, sed conteruntur, partes vicinæ dilacerantur, destruiturque solidorum textura; undè fracturæ complicatæ. Has inter causas annotanda sunt præ cæteris arma sclopetaria, quæ mediante pulvere

pyrio, tantâ velocitate tantoque impetu agunt, ut ossa crassiora resistere nequeant, contritaque subitò in minuta abeant fragmenta. Causæ internæ admitti nequeunt; tanquam prædisponentes tantum habeantur.

In fracturâ quâlibet attendenda sunt ossis structura, durities, articulorum connexio, partium vicinarum dispositio, sic enim inter se differunt fracturæ, & plus minùsve portentant periculi. Differunt etiam pro figurâ; indè transversa, obliqua, & attrita vel cum fragmentis, dicitur. Habitâ ratione essentiæ, vel simplex, vel composita, vel complicata distinguitur. Denique earum effectus diversi, pro variâ indole ossis fracti, pro modo fracturæ vario, pro vario loco, pro numero & figurâ fragmentorum, quantitate motûs, &c.

Visu, tactu, auditu, necnon accidentibus dignoscuntur variæ fracturarum species; at major membri distorsio, partium mollium gravior contusio & dilaceratio, apparentia sæpiùs fragmenta, irritatio, convulsio fracturam complicatam indicant, undè clarior ipsius diagnosi. Cùm autem percussione violentia ultrâ partem effectus suos sæpiùs extendat, nova indè etiam oritur accidentium consequentium soboles, quæ mali gravitatem prænuntiant. Ipsimet ergò fracturæ non tantum attendatur; resistentia ossis cum impetu causæ percutientis comparanda, si quidem tunc quò minor est fractura, eò majus commotionis periculum; hinc post ossa dura fracta commotio imminet in ratione reciproca minoris fracturæ.

Fracturam complicatam necessariò sequitur plurimum periculi, æstimandum pro naturâ ossis fracti, fracturæ loco, fragmentorum numero, figurâ, & magnitudine, pro partibus vicinis læsis, accidentibus, denique pro fracturæ causâ, modo percussione, &c. His & aliis circumstantiis ritè perpensis instituenda prognosis.

In fracturis complicatis, sicut & in simplicibus, ad sanationem requiruntur, quantum fieri possunt, 1°. Restitutio ossis fracti in

situm naturalem ; 2°. Retentio in situ accommodato per fascias & machinas ; 3°. Unitorum consolidatio. Hæ verò conditiones obtineri nequeunt, nisi amoveantur accidentia præsentia , & prævideantur futura , quæ curationis modum & normam sæpius immutant.

Extensio & Contra-extensio ad Artis leges accommodatæ præcedere debent Restitutionem ossis, quæ cautè & lentè fiet, os leniter contrectando, donec extrema fracta in locum debitum occurrant, partesque molles meliùs repositæ dolorem non patiantur. At Restitutio, licèt indicata, sæpiùs in primis temporibus non debet tentari, imò omittenda, si adsint major tumefactio, inflammatio & irritatio, donec accidentia resipiscant. Tunc tantùm, partibus in situ idoneò positis, iteratâ sanguinis missione, diætâ tenui, potu diluente, topicis emollientibus, resolventibus, aliisve pro re natâ indicatis, utendum. Dissipatis accidentibus, tutior & facilior fit Restitutio ossis, certior fracturæ sanatio, & membri conservatio. Si tamen accidentia oriantur à fragmentorum irritantium præsentia, tunc foret periculum in morâ, & licèt obstare videatur curationis ordo, celebranda nihilominùs Restitutio ossis, si quidem plus boni indè sperandum.

Si fragmenta sint libera & restitutioni obstant, exigenda ; si partes vicinas pungant & acumina eminentia extensionem planè prohibeant, excindenda, vel incisione deregenda, ut extrahantur ; partes molles tensæ incisionibus laxentur. His & aliis mediis, evanescent accidentia, partesque restitutæ faciliùs & tutiùs redintegrantur.

Splenia, fasciæ, ferulæ, canales, aliaque machinamenta partes reductas continent ; at in fracturis complicatis cautè debent adhiberi, ipsorumque applicatio, nisi mollior, saltem in primis temporibus ferè ableganda. Vulnèra, pro naturâ suâ, ex Artis legibus curentur ; apparatus idoneâ deligatione contineatur ; partesque tantùm leniter retinendæ, dùm resolvuntur accidentia. Fasciæ stric-

riores tunc nocerent; tumorem, suffocationem partis, gangrænam inducerent, dùm è contrà imminutis accidentibus, curationi feliciori favent & eam absolvunt.

Naturæ viribus unitorum consolidatio perficitur, callusque ob-
tinetur citior aut tardior pro ætate, ossis crassitie, habitu ægrotan-
tis, aliisque circumstantiis. Huic tantùm favet Ars situ debito, deli-
gatione idoneâ, diætâ congruâ; nihil operantur medicamenta ig-
naris laudata, nocent potiùs incautè adhibita. Hinc utilia licèt
contrà rigiditatem membrorum, fots, balnea, aquæ minerales;
in usum citiùs vocata, callum minùs firmum solvunt, consolida-
tioni obstant, curationique nocent.

Fractura graviter complicata, cum ingenti contusione, par-
tium mollium deperditione, ossium attritu, vasorum majorum
læsione, difficilem admittit curationem, imminens periculum sæ-
piùs importat, ideòque amputationem indicat citiùs tardiùsve
celebrandam. Hâc operatione, tempore idoneo tentatâ, plurimi
salvi facti sunt; hâc omisâ, at necessariâ, multò plures perierunt.
Amputationem ergo artuum tunc tantùm admittit Chirurgia, dùm
in extremis casibus ad vitæ conservationem tanta requiritur pri-
vatio; necessitate ducta, crudelem licèt, hanc operationem, hu-
manitatis legibus & obsequio cedens, cautè & prudenter admittit,
abusum verò hujus absolutè abnegat, & vitandam, quantum fieri
poteft, pronuntiat.

Amputatio, licèt indicata, sæpiùs tamen non est illicò necessaria
& procrastinari poteft, vel dùm minùs urgent accidentia, quibus
feliciter debellatis, vitatur operatio, vel dùm hæc periculosa fie-
ret, ob majorum accidentium præsentiam, quibus turbatur œco-
nomia animalis & huic medelæ sustinendæ fit impar. Quid ergò
ex ipsâ sperandum, quid pertimescendum attendere debet Chirur-
gus, ut, si utilem operam præstare non valet, saltem non noceat;
hæc præsertim in fracturis artuum complicatis consideranda sunt,
ut vitetur amputatio vel non; ut citiùs fiat vel procrastinetur. His

rationum momentis operatio absolute necessaria dijudicanda, ideoque tantum admittenda; sic certior fit Ars, & vulneratis tutior & salubrior.

Ossibus, licet in magnâ extensione fractis, partibusque mollibus dilaceratis, partis restituendæ spes non amovenda, si fragmenta ossium majora sint, non urgeant accidentia, congruaque auxilia adhibeantur; tunc enim, modò absit stupor à parte, profunt majores incisiones, quibus ossium fragmenta utilia reponuntur, inutilia separantur, educuntur corpora extranea, fluida stagnantia evacuantur, sicque vitatur amputatio.

Difficilius judicium in fracturis valdè complicatis, præsertim post vulnus sclopetarium. Ut autem aliquid tunc statuatur, considerari debent vulnerati natura & dispositio, partium affectarum conditio, contusionis gradus, partium mollium & tendinum dilaceratio, duriorum attritio, motus impressi quantitas, æstimanda commotionis violentia cujus effectus ad alias partes sæpius propagantur, tantò plus pertimescendi, quò plus adest in ossesoliditatis & resistentiæ; undè inflammatio, ingurgitatio, dolores vehementiores, convulsiones, stupor sæpius, mentis affectiones, animi deliquium, delirium, aliaque ejusmodi accidentia, quibus modò subvertitur corporea moles & ad ruinam tendit. Jam verò cum adsint accidentia primitiva, consecutivaque mox oriuntur, dubitandum an citior competat amputatio vel lentior? Sed tùm ex statu vulnerati supposito, tùm ex ipsâmet amputatione citiori, plurimum mali pertimescendum, siquidem jam sæviunt accidentia, novumque malum adderet tunc facta amputatio; indè enim augetur dolor, irritantur nervi, mutataque circulatio, præsertim si major sit membri moles, tumorem, inflammationem, ingurgitationem, plethoram, motusque vitalis suffocationem sæpius parit.

Debellatis accidentibus, amputationem feliciter succedere, videntur probare ratio & experientia. Ut hanc veritatem, inter dubiorum

biorum ambages, confirmaret laudandus observator, Cl. Faure (1). decem vulneratos, in quibus indicabatur amputatio, ab aliis semovit, remissisque accidentibus amputationem celebravit; salvi facti sunt omnes, dùm è contrà in amputationibus illicò tentatis plurimi perierunt; sic observationibus inter se comparatis patet hujus-ce methodi utilitas. Re quidem verâ, ad hanc curationem incisionibus accommodatis partes degurgitantur, educuntur corpora extranea, ossium fragmenta amoveantur vel reponuntur, sanguinis missionibus iteratis minuitur fluidorum moles; diætâ, potu, evacuantibus, topicis, restituitur partium quies, minuuntur inflammatio, tensio, febris; evacuantur abscessus, si qui superveniant, debellatur gangræna, promovetur laudanda suppuratio, sicque sæpiùs vix speranda obtinetur curatio; vel si amputatio requiratur, sedatâ animali œconomia, vix ulla oriuntur accidentia, minor est vulneris superficies, minor fit suppuratio, sequitur successus. Id ergò attendendum, ut æger neque fortior viribus suffocetur, quod timendum in primis temporibus, neque effectus præ debilitate occumbat.

In fracturis, præsertim post vulnera sclopetaria, complicatis, vel in vehementioribus contusionibus, attendenda etiam commotio quæ in ipsâmet parte læsâ non quiescit; cerebrum, nervos, omnesque partes afficit; cujusque tanta sæpè est violentia, ut partes stupefactæ dolorem vix patiantur; absunt ferè accidentia, vulneratus ipse quasi iners videtur, languent solida, fluida stagnant congesta oriturque sæpiùs gangræna. Tunc nocerent majores incisiones; sufficiunt sectiones necessariæ ad fluidorum stagnantium evacuationem; stimulanda solida, motus vitalis remediis idoneis revocandus. Erraret ergò, qui hanc partium inertiam pro minori malo haberet: inutilis, imò noxia, indicata licèt, tunc fieret amputatio,

(1) *Mémoire de M. Faure*, Tom. III in-4º. *Prix de l'Académie Royale de Chirurgie*.

si quidem dùm partem tollit, effectus à parte remotos non impedit, peritque vulneratus accidentium victima (1).

Jam verò cum experienciâ comprobatum sit accidentia vulgò cedere ad quindecimum vel vigesimum diem, indè patet tunc tantum remissis accidentibus, sedatâque œconomiâ animali, utilem & tutam futuram esse amputationem; & è contrâ subitò factam vel paulò post ictum, necessariò periculosam esse, plurimosque morti devovere.

Licèt ad ægrorum salutem sæpiùs procrastinari debeat operatio quibusdam tamen in casibus citò celebrandam exigunt læsionis natura & accidentium gravitas.

1°. Dùm membrum quodlibet, globo è tormento bellico emisso totum abrasum est & detruncatum, tunc certè apparet amputationis necessitas. Plurima enim pertimescenda sunt accidentia à dilaceratione muscutorum, tendinum, vasorum, nervorum; à contusione, à solutione inæquali parrium, ab acutis & pungentibus ossium fragmentis, à consequenti suppuratione putridâ, ab ipsâmet gangrênâ; sed hæc Artis auxilio vitari possunt, & amputatio tempestivè facta, vulnus contusum ad naturam vulneris simplicis reducit, suppurationem meliorem parat, & funestam sæpiùs partium irritationem prævenit vel dispellit. Periculosus his in casibus, licèt operationi non succedat curatio, indicationem nihilominus secuta est Ars salutaris, & malè argueretur, si quidem ex indè certior salutis spes, nec tunc dici potest eos occidere quos non salvat.

2°. Amputandum citò, si majores articulationes fractæ sint & attritæ, nullamque admittant repositionem; cùm enim tunc etiam adsit tendinum, ligamentorum, capsularum dilaceratio, indè pejor suppuratio, facilis ossium hîc porosorum alteratio, caries, fistulæ,

(1) Hanc Doctrinam dilucidè comprobavit non satis laudandus, M. Quesnay: *Traité de la Gangrène. Chapitre de la Gangrène par contusion.*

anchylosis, aliorumque accidentium funesta proles, amputatione, imò ipsâmet morte quandoque, pejor.

3^o. Post vulnera sclopetaria tanta sæpè est partium dilaceratio & deperditio, ut membri conservatio nec tentari, nec sperari queat; tunc etiam amputatio citò tentanda. Tam violenta enim imminet indè accidentium procella, ut mors modò sit pertimescenda, vel lento gradu adveniens, ægro, malis, doloribus, & phtysi consumpto, fiat desideranda. Parùm utiles tunc latæ & profundæ incisiones, & partium transversæ sectiones quibus educuntur corpora extranea; mox oriuntur indè suppuratio abundans, dolores diuturni, curatio longior, caries, anchylosis, membri difformitas, sæpius actio difficilis, quæ membri utilitatem impedit; æger malo insanabili affectus vitam tristem agit, quæ certè fuisset post amputationem minùs incommoda; interrogandi plurimi sic sanati, operationem desiderassent. Frustrà ergò opponerentur rara quædam curationum exempla; annumerandi potiùs quàm plurimi, quos salvasset amputatio (1). Errat ergò hujus-ce operationis maledicus Cl. Bilguer, dùm eam rarissimè administrandam, vel etiam penitus abrogandam declarat.

4^o. Ossibus comminutim fractis, si major sit partis ingurgitatio, consequentisque gangrenæ metus, & tamen absint vehementioris commotionis accidentia, imminenti malo feliciter opponitur amputatio; post eam enim fluida ingurgitata faciliùs evacuantur, meliùs restituuntur solida, & ad vivificas oscillationes excitantur. Sic admittenda operatio, quâ tempestivè factâ plures salvarentur.

5^o. Dùm in fracturis complicatis cum ossis deperditione & partium mollium dilaceratione, arteria major aperta est, tentarique

(1) *Vid.* Dissert. celeberr. M. de la Martinière, Chirurgi Regis primar. in quâ experienciâ comprobatur utilitas amputationis in quibusdam casibus, refutaturque Doctrina erronea Cl. Bilguer. In Commentar. Regiæ Academ. Chirurgiæ, Tom. IV.

nequeunt compressio vel ligatura, ità ut sanguis nullà Arte sisti valeat, tunc anceps ægri salus in amputatione citò quærenda.

6^o. Amputatio, quæ in aliis circumstantiis posset procrastinari, quandoque fit citò necessaria, inter armorum tumultus, ob vulneratorum translationem ad majorem distantiam, ob linteorum apparatusque penuriam, locorum angustiam, auxiliorum inopiam, denique dùm æger, ut decet, absolutè curari non potest.

In casibus modò enumeratis amputatio videtur citò necessaria nec procrastinari potest, si tunc nulla ferè curationis spes affulget, majoraque pertimescenda sunt accidentia, quæ ægrum mox tollunt de medio. Miranda quædam exempla curationis insperatæ frustra opponerentur; rara non sunt Artis, & nihil indè concludendum, si quidem ab expectatione dubior foret salutis alea, quàm ex ipsamet amputatione in ancipiti casu celebratâ.

Equidem plurimum periculi ex se prænuntiare videtur amputatio absque præparatione illicò facta & in ipsomet œconomiz animalis tumultu, ob eretismum nervosi generis, inflammationem, fluidorum depravationem; &c. sed eam tunc exigit rerum necessitas; alioquin procrastinandam operationem pronuntiamus, cum cæteris paribus, periculosior sit in hominibus robustis vel non præparatis, quàm in debilibus & emaciatis. Major aliundè sæpius est procrastinationis utilitas, nempè sanatio & membri conservatio; discussis enim accidentibus ossa quandoque coadunantur, partes molles redintegrantur & cicatrice obducuntur, functiones partium restituuntur. Si autem tam fausta curatio non obtineatur, tunc vel partes sponte separantur, vel naturâ monstrante viam, amputatio ad ægri salutem perficitur.

His rationibus ritè perpensis patet, amputationem sæpius vitari, semper quantum res permittit, procrastinandam esse; & ad eam, sive subitam sive procrastinatam, ex necessitatis absolutæ legibus, tantum esse procedendum.

*HAS Theses, DEO JUVANTE, & Praside M. TUSSANO
DE BORDENAVE, Artium & Chirurgiæ Magistro,
Scholarum Professore Regio, Regiæ Chirurgiæ Aca-
demiæ Ex-Directore, Collegii Antiquo Præposito,
è Regiâ Scientiarum Academiâ, Academicarum
Rhotomagensis, Lugdunensis & Florentinæ Socio, tueri
conabitur LUDOVICUS-PRUDENTIUS-ALEXANDER
HEVIN, Versaliensis, in alma Universitate Parisiensi
Artium Liberalium Magister, Theseos Auctor,*

P A R I S I I S,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS

*Die Sabbati undecimâ Julii Anno Salutis 1778, à sesqui secundâ
post meridiem ad septimam,*

PRO ACTU PUBLICO

E T

MAGISTERII LAUREÆ

Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ Collegii
necnon Academiæ Typographi, viâ Cithareâ,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY